

(CIPERMETRINA)

Inseticida piretróide concentrado emulsionável eficaz contra baratas, cupins, formigas, moscas e mosquitos.

VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS PROIBIDA A VENDA LIVRE

CUIDADO! PERIGOSO!

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Conteúdo: 1 litro

"Este produto é de uso exclusivo por empresas especializadas na prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, nos diversos ambientes, tais como indústrias em geral, instalações de produção, importação, exportação, manipulação, armazenagem, transporte, fracionamento, embalagem, distribuição e comercialização de: alimentos, produtos farmacêuticos, produtos para saúde, perfumes, produtos para higiene e cosméticos para a saúde humana e animal, fornecedores de matéria-prima, áreas hospitalares, clínicas, clubes, "shopping centers", residências e condomínios residenciais e comerciais, veículos de transporte coletivo, aeronaves, embarcações, aeroportos, portos, instalações aduaneiras e portos secos, locais de entretenimento e órgãos públicos e privados, entre outros."

COMPOSIÇÃO

Ingrediente Ativo: Cipermetrina.....25% m/v (26% m/m)
Ingredientes Inertes: Tensoativo e solvente.....71,2% m/v (74% m/m)

MODO DE USAR

CYPERATOR 25 CE pode ser diluído em água ou óleo mineral, podendo ser aplicado através de atomizadores, termonebulizadores e pulverizadores manuais ou motorizados, de acordo com as instruções abaixo.

Agite bem antes de usar.

INSTRUÇÕES DE USO

APLICAÇÃO ESPACIAL

Fog portátil: Para o controle de mosquitos, diluir 20 mL de CYPERATOR 25 CE por litro de diluente utilizado (óleo mineral). Aplicar 2 litros por hectare.

UBV portátil: Para controle de mosquitos, diluir 40 mL por litro de diluente utilizado (óleo mineral). Aplicar 0,5 litros por hectare.

As aplicações devem ser realizadas em condições atmosféricas adequadas, com pouco vento, ausência de chuva, evitando-se altas temperaturas e com a vazão do equipamento adequada à velocidade da aplicação. Aplicar nos horários de maior atividade da praga e regular o tamanho de gota em 15 a 18 micras (para aplicação UBV).

Intervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 01 dia.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem.

Recomenda-se não entrar no local tratado antes de, no mínimo, 30 minutos, ou o tempo necessário para que as gotas inseticidas sequem.

APLICAÇÃO DE SUPERFÍCIE

Controle de moscas: Diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água e aplicar (mínimo de 200 m² de superfície efetiva tratada) em paredes, janelas, portas e demais superfícies lisas onde as moscas pousam.

Controle de baratas e formigas: Diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água e aplicar (mínimo de 200 m² de superfície efetiva tratada) onde as pragas ocorrem e se escondem, tais como frestas, cantos, pisos, rachaduras etc.

Controle de cupins de madeira seca: Diluir 50 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de diluente (isoparafina ou outro) e aplicar ou injetar em madeiras ou superfícies que se deseja proteger.

Controle de cupins subterrâneos: Diluir 100 mL de CYPERATOR 25 CE em 10 litros de água.

Tratamento pré-construção: Antes da pavimentação, aplicar 5 litros da calda por m² sobre o solo. Após a construção da estrutura, fazer trincheira ao longo da mesma, com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade; aplicar aproximadamente 5 litros de calda por metro linear.

Tratamento pós-construção ou barreira: Após inspeção dos pontos de infestação, verifique as entradas e acessos dos cupins. Com a planta da edificação, perfure o piso ao longo de todo o perímetro das paredes e estruturas a serem protegidas com furos a cada 30 cm. Aplique o produto até formar uma barreira contínua em toda a edificação; aplicar aproximadamente 5 litros de calda por metro linear.

Intervalo entre aplicações: A empresa profissional de controle de pragas deve realizar o monitoramento das infestações e avaliar os locais que devem ser tratados e a necessidade de reaplicar o produto. O intervalo entre as aplicações deve ser de, no mínimo, 15 dias.

Intervalo de segurança para entrada no local tratado: Manter as portas e janelas abertas durante e após a aplicação para que as gotas do inseticida se dissipem ou sequem.

Recomenda-se não entrar no local tratado antes de, no mínimo, 4 horas, ou o tempo necessário para que as gotas inseticidas sequem.

RESTRICÇÕES DE USO

O produto quando aplicado nas doses e formas recomendadas não apresenta demais restrições de uso.

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO

- Conservar em temperatura ambiente (temperatura entre 15° e 30° C).
- Proteger da umidade.

PRECAUÇÕES DE USO

- **CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não fumar ou comer durante a aplicação.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Em caso de contato direto com este produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com a pele podem ocorrer sensações de formigamento, agulhadas, queimação ou coceira que poderiam começar até 4 horas após o contato. Essa sensação poderia persistir de 2 a 30 horas, cessando após este período. Se isto ocorrer, lave com água e sabão neutro e use creme hidratante ou pomada para assadura na pele afetada para aliviar essas sensações.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Proteja os olhos durante a aplicação.
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo à chama ou superfícies aquecidas.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar roupa protetora adequada, macacão de mangas compridas, botas, avental impermeável, luvas de borracha impermeável, proteção ocular e máscara de proteção com filtro adequado.
- Não aplique o produto nas horas mais quentes.
- Não aplique o produto na presença de pessoa asmática ou com problemas respiratórios.
- Não utilizar sobras de calda, nesse sentido não preparar quantidade de calda superior à que se preveja utilizar no dia ou no momento.
- **ARMAZENAMENTO:** Armazenar o produto em temperatura ambiente, protegido do sol e do calor. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens.
- **ELIMINAÇÃO E DESCARTE:** Em caso de derramamento do produto concentrado, isolar e sinalizar a área contaminada e seguir as instruções: PISO PAVIMENTADO: Recolher o produto com material absorvente inerte (terra serragem, sílica, gel ou outro) e colocar em recipientes devidamente identificados. SOLO: retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo seco e proceder como descrito anteriormente. CORPOS D'ÁGUA: Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa. Promover a aeração do local tratado a fim de diminuir a incidência de resíduos voláteis e do ativo no ambiente.
- Antes de descartar a embalagem vazia, realizar tripla lavagem das mesmas: colocar água limpa, tampar e agitar vigorosamente por cerca de trinta segundos. Repetir esta operação pelo menos três vezes, aproveitando a água da lavagem para preparo de calda inseticida.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual ou Federal específica. As embalagens após a tripla lavagem devem ser embaladas, usando-se luvas e sacos de descarte de material, e enviadas para incineração, distribuidor ou programa de reciclagem aprovado e credenciado. Consulte a Syngenta, distribuidor ou órgão ambiental sobre os procedimentos adequados.

FABRICADO POR

SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA.

Rodovia Professor Zeferino Vaz - SP 332, s/nº, Km 127,5 - Bairro Santa Terezinha - CEP: 13148-915 - CNPJ: 60.744.463/0010-80.

SYNGENTA SA.

Dir: Mamonal Carrt Mamonal, Km 6 - Cartagena, Bolívar. Colômbia

Ipanema - Indústria de Produtos Veterinários

Rod. Raposo Tavares, km 113 - Araçoiaba da Serra - SP - CNPJ: 64.687.015/0001-52 - CEP: 18190-000.

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento ao Consumidor: C.A.S.A. 0800 704 4304

Registro MS nº 3.0119.6650.001-8

Responsável Técnico: Amarildo Ament - CRQ nº.: 04215750 - IV Região – SP

"CYPERATOR 25 CE e o logo Syngenta são marcas de uma Companhia do Grupo Syngenta".

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Grupo químico: Piretróides

Nome comum: Cipermetrina

Antídoto / Tratamento Sintomático: Anti-histamínico e tratamento sintomático

Telefone de emergência: 0800 704 4304

Nº de Lote	4 anos a partir da data de fabricação
Data de Fabricação	
Prazo de Validade	